

KUALITAS  
YANG ANDA BUTUHKAN,  
HARGA YANG  
ANDA INGINKAN



**Orabloc®**

(Articaine HCl 4% and Epinephrine 1:100,000) Injeksi



# Orabloc®

Diproduksi di Italia oleh: Pierrel S.p.A.  
Strada Statale Appia 46/48 - 81043  
Capua (CE), Italia

## Articaine HCl 4% and Epinephrine 1:100,000 Injeksi

- Rapid onset anestesi dalam 1-3 menit.
- Anestesi lengkap berlangsung sekitar 1 jam untuk infiltrasi, hingga 2 jam untuk blok saraf.
- 10% kelebihan of epinephrine<sup>1</sup>.
- Umur simpan 24 bulan pada suhu kamar.
- Bebas natrium edetat, bebas metilparaben, dan bebas lateks.
- Efek samping yang paling umum (insiden >2%) adalah sakit kepala dan nyeri.
- Setiap carpul disegel satu per satu dalam blister untuk perlindungan maksimal.


**Orabloc diindikasikan untuk anestesi lokal, infiltratif, atau konduktif baik dalam prosedur gigi sederhana maupun kompleks.**

## Kedua kekuatan Orabloc memiliki umur simpan 24 bulan

- Simpan pada suhu kamar; 25°C (77°F), dengan kunjungan singkat diizinkan antara 15°C (59°F) dan 30°C (86°F).
- Lindungi dari cahaya.
- Jangan membeku.

## Kemasan Orabloc

- Setiap carpul disegel secara individual untuk perlindungan maksimal hingga saat digunakan.
- Carpul dikemas 10 ke wadah blister untuk menghindari kontak gelas ke gelas.
- Wadah blister dikemas dalam 50 kotak.



## Dosis dan cara pemberian – Dewasa

- Untuk orang dewasa normal yang sehat, dosis maksimum Orabloc yang diberikan melalui infiltrasi submukosa dan/atau blok saraf tidak boleh melebihi 7mg/kg (0,175 mL/kg) articaine HCl.
- Dosis harus dikurangi pada pasien usia lanjut dan pada pasien dengan penyakit jantung atau hati.

## Pasien anak usia 4 sampai 16 tahun

- Jumlah Orabloc pada anak usia 4 hingga 16 tahun yang akan disuntikkan harus ditentukan oleh usia dan berat anak serta besarnya operasi.
- Dosis maksimum Orabloc tidak boleh melebihi 7 mg/kg (0,175 mL/kg) articaine HCl (lihat Penggunaan pada Populasi Tertentu). Penggunaan pada pasien anak di bawah 4 tahun tidak dianjurkan.

## INFORMASI KESELAMATAN PENTING

Perhatian harus diberikan untuk menghindari injeksi intravaskular yang tidak disengaja, yang mungkin berhubungan dengan kejang yang diikuti dengan koma dan henti napas. Larutan anestesi lokal yang mengandung vasokonstriktor harus digunakan dengan hati-hati, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi kardiovaskular atau penyakit vaskular. Pemberian Orabloc menghasilkan peningkatan 3 sampai 5 kali lipat dalam konsentrasi epinephrin plasma dibandingkan dengan baseline. Namun, pada orang dewasa yang sehat tampaknya tidak berhubungan dengan peningkatan yang nyata pada tekanan darah atau denyut jantung, kecuali dalam kasus injeksi intravaskular yang tidak disengaja. Efek samping yang paling umum (insiden >2%) adalah sakit kepala dan nyeri. Beri tahu pasien sebelumnya tentang kemungkinan hilangnya sensasi dan fungsi otot sementara setelah infiltrasi dan injeksi blok saraf. Anjurkan pasien untuk tidak makan atau minum sampai sensasi normal kembali.

Silakan lihat informasi resep lengkap yang menyertainya atau kunjungi [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

---

Orabloc adalah anestesi lokal golongan amida yang mengandung vasokonstriktor yang diindikasikan untuk anestesi lokal, infiltratif, atau konduktif baik pada prosedur gigi sederhana maupun kompleks. Orabloc mengandung natrium metabisulfid. Orabloc dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitif terhadap produk yang mengandung sulfid. Produk yang mengandung sulfid dapat menyebabkan reaksi tipe alergi termasuk gejala anafilaksis dan episode asma yang mengancam jiwa atau kurang parah pada orang tertentu yang rentan. Silakan untuk melihat atau mengunduh informasi peresepan lengkap, kunjungi [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

---

Silakan lihat informasi resep lengkap yang menyertainya atau kunjungi [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com) menggunakan kode QR.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Orabloc, hubungi Pierrel di 1-610-989-4222 atau email ke [orabloc@pierrelgroup.com](mailto:orabloc@pierrelgroup.com)

