

Качество по разумной цене.



Анестетик для стоматологии.

Orabloc[®]

(артикаина гидрохлорид 4% и адреналин 1:100,000)
Раствор для инъекций.

Регистрационное удостоверение в Кыргызской Республике:
KG.1.3.251.08062-2020



Orabloc®

Артикаина гидрохлорид 4% и адреналин 1:100,000

- » Быстрое начало действия анестезии (1-3 минуты).
- » Полная длительность около 1 часа при инфильтрационной анестезии и до 2 часов при блокаде нерва.
- » 10% переизбыток эpineфрина¹.
- » Срок годности 24 месяца при комнатной температуре.
- » Не содержит эдетат натрия, метилпарабен и латекс.
- » Каждый картридж запечатан в отдельный блистер.

Orabloc показан для местной, инфильтрационной или проводниковой анестезии как при простых, так и при сложных стоматологических процедурах.



Условия хранения:

- » Хранить при комнатной температуре: 25°C (77°F). Беречь от света!
- » Не замораживать!

Упаковка:

- » Каждый картридж индивидуально запечатан.
- » Картриджи упакованы по 10 штук в блистерную упаковку.
- » Блистеры упакованы в картонную коробку. В каждой коробке 50 картриджей.

Дозировка – Взрослые пациенты:

- » Для здоровых взрослых максимальная доза, вводимая путем подслизистой инфильтрации и/или блокады нерва, не должна превышать 7 мг/кг (0,175 мл/кг) артикаина гидрохлорида.
- » Дозировка должна быть уменьшена для пожилых пациентов и для пациентов с заболеваниями сердца или печени.

Дозировка – Дети в возрасте от 4 до 16 лет:

- » Количество Orabloc для инъекций детям в возрасте от 4 до 16 лет должно определяться возрастом и массой тела ребенка, а также видом лечения.
- » Максимальная доза Orabloc не должна превышать 7 мг/кг (0,175 мл/кг) гидрохлорида артикаина (см. Инструкцию по применению, пункт «Использование у определенных групп населения»). Применение у детей в возрасте до 4 лет не рекомендуется.

¹Американская кардиологическая ассоциация (АКА) рекомендует использовать минимально возможное количество адреналина (Каплан Э.Л., изд. Сердечно-сосудистые заболевания в стоматологической практике, Даллас, Техас: Американская кардиологическая ассоциация, 1986).

Произведено в Италии компанией Pierrgel S.p.A
Официальный Дистрибьютор на территории Кыргызской Республики:
ОсОО «Дент Трейд»
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 217
Тел.: +996 312 90-13-16, +996 312 90-10-04
@ denttrade.kg

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного внутрисосудистого введения, которое может быть связано с судорогами с последующей комой и остановкой дыхания. Растворы местных анестетиков, содержащие вазоконстрикторы, следует использовать с осторожностью, особенно у пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой функции или сосудистыми заболеваниями. Введение Orabloc приводит к увеличению концентрации адреналина в плазме в 3-5 раз по сравнению с исходным уровнем. Однако, у здоровых взрослых это не вызывает заметное повышение артериального давления или частоту сердечных сокращений, за исключением случаев случайной внутрисосудистой инъекции. Наиболее частыми побочными реакциями (частота >2%) являются головная боль и боль во время введения анестетика. Заранее информируйте пациентов о возможности временной потери чувствительности и мышечной функции после инфильтрации и инъекций блокады нервов. Проинструктируйте пациентов не есть и не пить до тех пор, пока не вернется нормальная чувствительность.

Orabloc представляет собой амидный местный анестетик, содержащий вазоконстриктор, предназначенный для местной, инфильтрационной или проводниковой анестезии как при простых, так и при сложных стоматологических процедурах. Orabloc содержит метабисульфит натрия. Orabloc противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к продуктам, содержащим сульфиты. Продукты, содержащие сульфиты, могут вызывать реакции аллергического типа, включая анафилактические симптомы и опасные для жизни или менее тяжелые приступы астмы у некоторых восприимчивых людей.