


KVALITA, KTORÚ POTREBUJETE CENA, KTORÚ CHCETE



26,90 € s DPH

AKCIA 10+1 finálna cena 24,50 €
/možnosť kombinovať Orabloc a Orabloc Forte/

Orabloc®

Orabloc a Orabloc Forte

(40 mg/ml artikaínium-chloridu a 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu) a 40 mg/ml artikaínium-chloridu a 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu), injekčný roztok



Orabloc je lokálne anestetikum amidového typu obsahujúce vazokonstriktor, indikované na lokálnu infiltračnú alebo zvodovú anestéziu pri jednoduchých aj zložitých dentálnych zákrokoch.

**40 mg/ml artikaínium-chloridu
a 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu)
a 40 mg/ml artikaínium-chloridu
a 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu), injekčný roztok**

- » Rýchly nástup anestézie v priebehu 1 – 3 minút.
- » Úplná anestézia pôsobí približne 1 hodinu pri infiltrácii, do 2 hodín pri blokáde nervu.
- » 10 % nadbytočného adrenalínu (epinefrínu).
- » Čas použiteľnosti pri izbovej teplote 24 mesiacov.
- » Neobsahuje edetát sodný, metylparabén a latex.
- » Najčastejšie nežiaduce reakcie (výskyt > 2 %) sú bolesť hlavy a bolesť.
- » Každá náplň je samostatne zapečatená v blistri na zabezpečenie maximálnej ochrany.

Orabloc je indikovaný na lokálnu infiltračnú alebo zvodovú anestéziu pri jednoduchých aj zložitých dentálnych zákrokoch:

- » Pri väčšine bežných dentálnych zákrokov sa prednostne používa Orabloc obsahujúci 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu).
- » V prípadoch, keď je potrebný výraznejší účinok alebo zreteľnejšie zobrazenie chirurgického poľa, sa môže použiť Orabloc Forte obsahujúci 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu).

Obe sily Orablocu majú čas použiteľnosti 24 mesiacov.

- » Uchovávajú sa pri izbovej teplote, 25 °C, s povolenými krátkymi prerušeniami v rozsahu od 15 °C do 30 °C.
- » Chránite pred svetlom.
- » Nezmrazujte.

Balenie Orablocu

- » Každá náplň je samostatne zapečatená na maximálnu ochranu až do okamihu použitia.
- » Náplne sú balené po 10 v blistroch, aby sa zabránilo kontaktu skla o sklo.
- » Blistre sú balené v škatulkách po 50.

Orabloc obsahuje disiričitan sodný. Orabloc je kontraindikovaný u pacientov s precitlivosťou na lieky obsahujúce siričitan. Lieky obsahujúce siričitan môžu u niektorých náchylných osôb vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktických príznakov a život ohrozujúcich alebo menej závažných astmatických záchvatov.

Dávkovanie a spôsob podávania – dospelí

- » Maximálna dávka Orablocu u zdravých dospelých podaná submukóznou infiltráciou a/alebo na blokádu nervu nemá prekročiť 7 mg/kg (0,175 ml/kg) artikaínium-chloridu.
- » Dávka sa má znížiť u starších pacientov a pacientov s ochoreniami srdca a pečene.

Pediatrickí pacienti vo veku od 4 do 16 rokov

- » Množstvo Orablocu na injekčné podanie u detí vo veku od 4 do 16 rokov sa má určiť v závislosti od veku a hmotnosti dieťaťa a rozsahu zákroku.
- » Maximálna dávka Orablocu nemá presiahnuť 7 mg/kg (0,175 ml/kg) artikaínium-chloridu (pozri Použitie v osobitných skupinách populácie). Neodporúča sa použitie u detí mladších ako 4 roky.

DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÁ INFORMÁCIA

Je potrebné dbať na to, aby sa predišlo neúmyselnému podaniu injekcie intravaskulárne, čo by mohlo viesť k vzniku kŕčov s následnou kómou a zástavou dýchania.

Lokálne anestetiká, ktoré obsahujú vazokonstriktor, sa majú používať opatrne, najmä u pacientov s kardiovaskulárnou poruchou alebo vaskulárnym ochorením.

Podanie Orablocu vedie k 3- až 5-násobnému zvýšeniu koncentrácie adrenalínu (epinefrínu) v plazme v porovnaní s východiskovými hodnotami.

Zdá sa však, že u zdravých dospelých nie je spojené s pozorovateľným zvýšením krvného tlaku alebo pulzu, okrem prípadov neúmyselného podania injekcie intravaskulárne.

Najčastejšie nežiaduce reakcie (výskyt > 2 %) sú bolesť hlavy a bolesť. Informujte pacientov vopred o možnej dočasnej strate citlivosti a funkčnosti svalov po podaní injekcie na infiltračnú anestéziu a anestéziu blokádou nervov.

Poučte pacientov, aby nejedli ani nepili, kým sa im nevráti normálna citlivosť.

Výhradný distribútor pre SR:

Topdental Slovensko s.r.o.
Záhradnícka 36
821 08 Bratislava

Pozrite si priložené úplné informácie o lieku alebo navštívte www.topdental.eu

Ak sa chcete dozvedieť viac o Orablocu, zatelefonujte do **Topdental Slovensko** na **0800 939 939** alebo pošlite email na info@topdental.eu

