

# CILËSIA QË JU DUHET, ÇMIMI QË DËSHIRONI



## Orabloc®

(artikainë HCl 4% dhe epinefrinë 1:100,000)  
Injeksion



## Artikainë HCl 4% dhe epinefrinë 1:100,000 - Injeksion

- » Fillimi i shpejtë i anestezisë brenda 1-3 minutave.
- » Anestezia e plotë zgjat rreth 1 orë për infiltrimin, deri në 2 orë për bllokimin nervor.
- » Mbi 10% epinefrinë<sup>1</sup>.
- » Jetëgjatësia 24 muaj në temperaturën e dhomës.
- » Pa edetat natriumi, pa metilparaben dhe pa lateks.
- » Reaksionet anësore më të zakonshme (incidenca >2%) janë dhimbja e kokës dhe dhimbjet normale.
- » Çdo shishe mbyllet individualisht për mbrojtje maksimale.

### Orabloc sugjerohet për anestezia lokale, infiltrative ose përcjellëse si në procedurat dentare të thjeshta ashtu edhe ato komplekse:

- » Kur kërkohet homeostazë më e theksuar ose vizualizimi i përmirësuar i fushës kirurgjikale, mund të përdoret Orabloc që përmban epinefrinë 1:100,000.

### Të dy llojet e Orabloc kanë një jetëgjatësi prej 24 muajsh

- » Ruani në temperaturën e dhomës; 25°C (77°F), me ekskursione të shkurtra të lejuara ndërmjet 15°C (59°F) dhe 30°C (86°F).
- » Mbrojeni nga drita.
- » Mos e ngrini.

### Paketimi Orabloc

- » Çdo shishe është e mbyllur individualisht për mbrojtje maksimale deri në momentin e përdorimit.
- » Shishe të paketuara nga 10 copë në një tabaka për të shmangur kontaktin mes njëra tjetrës
- » Tabaka me shishe të paketuara në kuti 50 copë.

### Dozimi dhe administrimi - Për të rriturit

- » Për të rriturit e shëndetshëm, doza maksimale e Orabloc e administruar me infiltrim submukozal dhe/ose bllokim nervor nuk duhet të kalojë 7 mg/kg (0,175 mL/kg) HCl artikaine.
- » Doza duhet të reduktohet në pacientët e moshuar dhe në pacientët me sëmundje të zemrës ose të mëlçisë.

### Pacientët pediatrikë nga 4 deri në 16 vjeç

- » Sasia e Orablocit tek fëmijët e moshës 4 deri në 16 vjeç që do të injektohet duhet të përcaktohet nga moshja dhe pesha e fëmijës si dhe nga madhësia e operacionit.
- » Doza maksimale e Orabloc nuk duhet të kalojë 7 mg/kg (0,175 mL/kg) të artikainës HCl (shih Përdorimi në Popullsi Specifike). Nuk rekomandohet përdorimi në pacientët pediatrik nën 4 vjeç.

## INFORMACION I RËNDËSISHËM LIDHUR ME SIGURINË

Duhet pasur kujdes për të shmangur injeksionin aksidental intravaskular, i cili mund të shoqërohet me konvulsionet të pasuara nga koma dhe ndalim respirator. Solucionet anestezike lokale që përmbajnë një vazokonstriktor duhet të përdoren me kujdes, veçanërisht në pacientët me funksion të dëmtuar kardiovaskular ose sëmundje vaskulare. Administrimi i Orabloc rezulton në një rritje 3 deri në 5 herë të përqendrimit të epinefrinës në plazmë krahasuar me nivelin fillestar. Megjithatë, tek të rriturit e shëndetshëm nuk duket të shoqërohet me rritje të theksuar të presionit të gjakut ose të rrahjeve të zemrës, përveç në rastin e injektimit aksidental intravaskular.

Reaksionet anësore më të zakonshme (incidenca >2%) janë dhimbja e kokës dhe dhimbjet normale. Informoni pacientët paraprakisht për mundësinë e humbjes së përkohshme të ndjeshmërisë dhe funksionit të muskujve pas infiltrimit dhe injeksioneve të bllokut nervor.

Udhëzoni pacientët që të mos hanë ose pinë derisa të kthehet ndjesia normale.

Ju lutemi shikoni informacionin e plotë të përshkrimit shoqëruar ose vizitoni [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

Orabloc është një anestetik lokal amide që përmban një vazokonstriktor të sugjeruar për anestezia lokale, infiltrative ose përcjellëse në procedurat dentare të thjeshta dhe komplekse. Orabloc përmban sodium metabisulfid. Orabloc nuk sugjerohet për pacientët të cilët janë të tejndjeshëm ndaj produkteve që përmbajnë sulfite. Produktet që përmbajnë sulfite mund të shkaktojnë reaksione të tipit alergjik duke përfshirë simptoma anafilaktike dhe episode kërcënuese për jetën ose më pak të rënda astmatike në disa njerëz të ndjeshëm. Ju lutemi, për të parë ose shkarkuar informacionin e plotë të përshkrimit, vizitoni [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

Ju lutemi shikoni informacionin e plotë të përshkrimit shoqëruar ose vizitoni [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com) duke përdorur kodin QR. Për më shumë rreth Orabloc telefononi Pierrel në 1-610-989-4222 apo email [orabloc@pierrelgroup.com](mailto:orabloc@pierrelgroup.com)

