

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ  
ВАМ НУЖНО, ЦЕНА,  
КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ



**Orabloc®**

Артикаина гидрохлорид 4% и эпинефрин 1:100 000 и  
эпинефрин 1:200 000. Инъекции.



## Артикаина гидрохлорид 4% и эпинефрин 1:100 000 и эпинефрин 1:200 000. Инъекции.

- Быстрое наступление анестезии в течение 1-9 минут
- Полная анестезия длится около 1 часа при инфильтрации, до 2 часов при блокаде нервов
- 10% перезакладка эпинефрина<sup>1</sup>
- Срок годности 24 месяца при комнатной температуре
- Не содержит натрия эдетат, метилпарабен и латекс
- Наиболее распространенными побочными реакциями (частота >2%) являются головная боль и болевые ощущения
- Каждый картридж запечатан индивидуально в блистер для максимальной защиты

**«Orabloc» показан для местной, инфильтрационной или проводниковой анестезии, как при простых, так и при сложных стоматологических процедурах:**

- Для большинства рутинных стоматологических процедур предпочтительнее использовать «Orabloc», содержащий эпинефрин в пропорции 1:200 000.
- Если требуется более выраженный гомеостаз или улучшенная визуализация хирургического поля, можно использовать «Orabloc», содержащий эпинефрин в пропорции 1:100,000.

**Срок годности обоих препаратов «Orabloc» составляет 24 месяца:**

- Хранить при комнатной температуре 25°C (77°F), с кратковременными перерывами от 15°C (59°F) до 30°C (86°F).
- Беречь от света
- Не замораживать

### Упаковка «Orabloc»

- Каждый картридж индивидуально запечатан для максимальной защиты до момента использования
- Картриджи упакованы по 10 штук в блистере во избежание контакта стекла со стеклом
- Блистеры упакованы в коробки по 50 штук

### Дозировка и применение - Взрослые

- Для нормально здорового взрослого максимальная доза «Orabloc», вводимого под слизистую и/или при блокаде нервов, не должна превышать 7 мг/кг (0,175 мл/кг) артикаина гидрохлорида.
- Дозировка должна быть снижена для пожилых пациентов и пациентов с заболеваниями сердца или печени.

### Дети в возрасте от 4 до 16 лет

- Количество вводимого препарата «Orabloc» у детей от 4 до 16 лет должно определяться возрастом и весом ребенка, а также масштабами операции
- Максимальная доза «Orabloc» не должна превышать 7 мг/кг (0,175 мл/кг) артикаина гидрохлорида (см. раздел "Применение в особых группах"). Применение для детей в возрасте до 4 лет не рекомендуется.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного внутрисосудистого попадания, которое может быть связано с конвульсиями с последующей комой и остановкой дыхания. Растворы местных анестетиков, содержащие вазоконстриктор, следует использовать с осторожностью, особенно у пациентов с нарушением функции сердечно-сосудистой системы или сосудистыми заболеваниями. Введение препарата «Orabloc» приводит к 3-5-кратному увеличению концентрации эпинефрина в плазме крови по сравнению с исходным уровнем. Однако у здоровых взрослых людей он не ассоциируется с выраженным повышением кровяного давления или частоты сердечных сокращений, за исключением случайного внутрисосудистого попадания. Наиболее распространенными побочными реакциями (частота >2%) являются головная боль и болевые ощущения. Информировать пациентов заранее о возможности временной потери чувствительности и функции мышц после инфильтрации и блокады нервов. Проинструктируйте пациентов не есть и не пить до тех пор, пока не вернется нормальная чувствительность.

Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией, которая прилагается или посетите сайт [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

«Orabloc» - это амидный местный анестетик, содержащий вазоконстриктор, показанный для местной, инфильтративной или проводниковой анестезии при простых и сложных стоматологических процедурах. «Orabloc» содержит метабисульфит натрия. «Orabloc» противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к продуктам, содержащим сульфиты. Продукты, содержащие сульфиты, могут вызывать аллергические реакции, включая анафилактические симптомы и угрожающие жизни или менее тяжелые астматические приступы у некоторых восприимчивых людей. Чтобы посмотреть или скачать полную информацию о назначении препарата, посетите сайт [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com).



Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией, которая прилагается, или посетите сайт [www.orabloc.com](http://www.orabloc.com)

Для получения подробной информации о препарате «Orabloc» позвоните в компанию «Pierrel» по номеру: 1-610-989-4222 или напишите на электронный адрес: [orabloc@pierrelgroup.com](mailto:orabloc@pierrelgroup.com)

<sup>1</sup>Американская ассоциация кардиологов (АНА) рекомендует использовать минимально возможное количество эпинефрина (ред. Каплан ЭЛ «Сердечно-сосудистые заболевания в стоматологической практике». Даллас, штат Техас: Американская ассоциация кардиологов, 1986)