

KVALITET KOJI
VAM JE
POTREBAN,
CIJENA KAKVU
ŽELITE



Orabloc[®]

(artikain HCl 4% i epinefrin 1:100.000)

Injeksija



Artikain HCl 4% i epinefrin 1:100.000. Injekcija.

- » Brzo dejstvo anestezije u roku od 1 do 3 minute.
- » Potpuno dejstvo anestetika je oko 1 sat kod infiltracione anestezije, i do 2 sata kod sprovodne.
- » 10% epinefrina u višku¹.
- » Rok trajanja 24 mjeseca na sobnoj temperaturi.
- » Bez natrijum edetata, metilparabena i lateksa.
- » Najčešća neželjena dejstva (incidenca > 2%) su glavobolja i bol.
- » Svaka patrona je pakovana posebno u blister radi maksimalne zaštite.

Orabloc je indikovano za lokalnu, infiltracionu ili sprovodnu anesteziju, kod jednostavnih i složenih stomatoloških procedura:

- » Kada je potrebna izraženija hemostaza ili bolji pregled hirurškog radnog polja, može se koristiti Orabloc koji sadrži epinefrin 1:100.000.

Obje jačine anestetika Orabloc imaju rok upotrebe 24 mjeseca

- » Čuvati na sobnoj temperaturi; 25°C (77°F), uz dopuštena odstupanja između 15°C (59°F) i 30°C(86°F).
- » Zaštititi od svjetlosti.
- » Ne zamrzavati.

Orabloc pakovanje

- » Svaka patrona je zasebno zapečaćena radi maksimalne zaštite do trenutka upotrebe.
- » Patrone su pakovane po 10 u blister podložak kako bi se izbjegao kontakt stakla o staklo.
- » Blister podlošci pakovani su u kutije od 50 komada.

Doziranje i primjena- Odrasli

- » Kod zdravih odraslih osoba, maksimalna doza Orabloc anestetika primijenjena submukoznom infiltracijom i/ili sprovodnom anestezijom ne bi trebala da prevazilazi 7 mg/kg (0,175 ml/kg) artikain HCl.
- » Doza bi trebala biti manja kod osoba starije životne dobi i kod pacijenata sa bolestima srca i jetre.

Pedijatrijski pacijenti uzrasta od 4 do 16 godina

- » Količinu Orabloc anestetika kod djece uzrasta od 4 do 16 godina za injekciju treba odrediti prema uzrastu i tjelesnoj masi djeteta, te prema trajanju intervencije.
- » Najviša doza anestetika Orabloc ne treba da prelazi 7 mg/kg (0,175 ml/kg) artikain HCl (vidjeti Upotreba kod Posebnih populacija). Ne preporučuje se upotreba kod pedijatrijskih pacijenata mlađih od 4 godine.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Treba paziti, da se izbjegne slučajno ubrizgavanje u krvni sud, koje se može dovesti u vezu sa konvulzijama praćenim komom i respiratornim arestom. Otopine za lokalne anestetike koje sadrže vazokonstriktor treba koristiti oprezno, naročito kod pacijenata s oštećenom kardiovaskularnom funkcijom ili vaskularnom bolešću. Primjena anestetika Orabloc dovodi do povećane koncentracije epinefrina u plazmi za 3 do 5 puta u odnosu na početne vrijednosti. Međutim, kod zdravih odraslih osoba čini se da nije povezano sa izrazitim povećanjem krvnog pritiska ili srčanih otkucaja, osim u slučaju nenamjernog ubrizgavanja u krvni sud. Najčešća neželjena dejstva (incidenca >2%) su glavobolja i bol. Unaprijed obavijestite pacijente o mogućnosti privremenog gubitka osjećaja i mišićne funkcije nakon infiltracione i sprovodne anestezije. Uputite pacijente da ne jedu i ne piju dok im se ne vrati normalan osjećaj.

Molimo pogledajte potpune propratne informacije o propisivanju ili posjetite www.orabloc.com

Orabloc je amidni lokalni anestetik koji sadrži vazokonstriktor a indikovano je za lokalnu, infiltracionu ili sprovodnu anesteziju, kod jednostavnih i složenih stomatoloških procedura. Orabloc sadrži natrijum metabisulfit. Orabloc je kontraindikovano kod pacijenata koji su preosjetljivi na proizvode koji sadrže sulfite. Proizvodi koji sadrže sulfite mogu uzrokovati alergijsku reakciju, uključujući anafilaktičke simptome i po život opasne ili slabije astmatične epizode kod određenih osjetljivih osoba. Molimo Vas da pogledate ili preuzmete potpune informacije o propisivanju www.orabloc.com

Molimo pogledajte propratne potpune informacije o propisivanju ili posjetite www.orabloc.com koristite QR kod.

Za više informacija o anestetiku Orabloc nazovite Pierrel na 1-610-989-4222 ili putem e-mail orabloc@pierrelgroup.com

