

CALITATEA DE CARE AVEȚI NEVOIE, PREȚUL PE CARE ÎL DORIȚI



Orabloc®

Orabloc® și Orabloc® Forte
(articaină HCl 4% și epinefrină 1:100.000 și
epinefrină 1:200.000) Injecție



Articaină HCl 4% / epinefrină

1:100.000

Articaină HCl 4% / epinefrină

1:200.000.

Soluție injectabilă

- » Instalarea rapidă a anesteziei în 1-3 minute.
- » Anestezia completă durează aproximativ 1 oră pentru infiltrații, până la 2 ore pentru blocajul nervos.
- » 10% surplus de epinefrină¹.
- » Termen de valabilitate de 24 de luni la temperatura camerei.
- » Fără edetat de sodiu, fără metilparaben și fără latex.
- » Cele mai frecvente reacții adverse (incidență >2%) sunt cefaleea și durerea. Fiecare cartuș este sigilat individual în blister pentru protecție maximă.

Orabloc® este indicat pentru anestezie locală, infiltrativă sau conductivă, atât pentru proceduri dentare simple, cât și complexe:

- » Pentru majoritatea procedurilor stomatologice de rutină, se preferă Orabloc® care conține epinefrină 1:200.000.
- » Atunci când este necesară o hemostază mai pronunțată sau o vizualizare mai bună a câmpului chirurgical, se poate utiliza Orabloc® care conține epinefrină 1:100.000.

Ambele produse Orabloc® au un termen de valabilitate de 24 de luni.

- » A se păstra la temperatura camerei; 25°C (77°F), cu scurte variații permise între 15°C (59°F) și 30°C (86°F).
- » A se feri de lumină.
- » A nu se congela.

Ambalarea Orabloc®

- » Fiecare cartuș este sigilat individual pentru o protecție maximă până în momentul utilizării.
- » Cartușele sunt ambalate câte 10 într-o tăviță tip blister pentru a evita contactul dintre sticlă și sticlă.
- » Folii tip blister ambalate în cutii de câte 50.

Dozare și administrare - Adulți

- » Pentru adulții sănătoși, doza maximă de Orabloc® administrată prin infiltrație submucoasă și/sau bloc nervos nu trebuie să depășească 7mg/kg (0,175 ml/kg) de articaină HCl.
- » Dozajul trebuie redus la pacienții vârstnici și la pacienții cu afecțiuni cardiace sau hepatice.

Copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani

- » Cantitatea de Orabloc® la copiii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani care trebuie injectată trebuie să fie determinată de vârsta și greutatea copilului și de amploarea intervenției.
- » Doza maximă de Orabloc® nu trebuie să depășească 7 mg/kg (0.175 mL/kg) de articaină HCl (a se vedea Utilizarea la populații specifice). Nu se recomandă utilizarea la copiii cu vârsta sub 4 ani

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

¹Asociația Americană a Inimii (AHA) recomandă utilizarea celei mai mici cantități posibile de epinefrină (Kaplan EL ed. Cardiovascular disease in

Administrarea necesită atenție sporită pentru a se evita injectarea intravasculară accidentală, care poate fi asociată cu convulsii urmate de comă și stop respirator.

Soluțiile de anestezic local care conțin un vasoconstrictor trebuie utilizate cu prudență, în special la pacienții cu afectare a funcției cardiovasculare sau cu afecțiuni vasculare.

Administrarea de Orabloc® determină o creștere de 3 până la 5 ori a concentrațiilor plasmatice de epinefrină față de valorile inițiale.

Cu toate acestea, la adulții sănătoși nu pare să fie asociată cu creșteri marcate ale tensiunii arteriale sau ale frecvenței cardiace, cu excepția cazului de injectare intravasculară accidentală.

Cele mai frecvente reacții adverse (incidență >2%) sunt cefaleea și durerea. Informați pacienții în prealabil cu privire la posibilitatea pierderii temporare a sensibilității și a funcției musculare în urma infiltrațiilor și a injecțiilor de bloc nervos.

Indicați pacienților să nu mănânce sau să bea până la revenirea la normal a simțurilor.

Vă rugăm să consultați informațiile complete de prescriere alăturate sau să vizitați www.dentadeals.ro.

Orabloc® este un anestezic local amidic care conține un vasoconstrictor indicat pentru anestezie locală, infiltrativă sau conductivă în procedurile dentare simple și complexe. Orabloc® conține metabisulfid de sodiu. Orabloc® este contraindicat la pacienții care sunt hipersensibili la produsele care conțin sulfiți. Produsele care conțin sulfiți pot provoca reacții de tip alergic, inclusiv simptome anafilactice și episoade astmatice mai puțin severe sau care pun viața în pericol la anumite persoane sensibile.

Vă rugăm să consultați informațiile complete de prescriere alăturate sau să vizitați www.orabloc.com utilizând codul QR. Pentru a afla mai multe despre Orabloc, sunați la Pierrel la 1-610-989-4222 sau trimiteți un e-mail la orabloc@pierrelgroup.com

Orabloc® este distribuit în România de Expert Tech Solutions SRL
Tel: 00 40 799 723 422 sau e-mail: contact@dentadeals.ro

