

**ЯКІСТЬ, ЯКА ВАМ ПОТРІБНА,
ЗА ПРИЙНЯТНУ ЦІНУ**



ОРАБЛОК. ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ

(артикаїну гідрохлорид 4% та
епінефрин 1:100 000 і епінефрин 1:200 000)
розчин для ін'єкцій



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- **Швидкий початок анестезії (1-3 хвилини)**
- **Застосовується для інфільтраційної та провідникової анестезії**
- **Тривалість ефективної анестезії становить приблизно 75 хвилин**
- **10% допустимий надлишок адреналіну¹**
- **Термін придатності 2 роки**
- **Зберігати при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці для захисту від дії світла**
- **НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ**
- **Відсутні: едетат натрію, метилпарабен, латекс**
- **Найбільш поширені побічні реакції: головний біль, місцеве порушення чутливості**
- **Кожний картридж герметично закривається в блістер**

Ораблок показаний для інфільтраційної та провідникової анестезії в стоматології:

- Для більшості рутинних стоматологічних процедур кращим вибором є **Ораблок 1:200 000**
- При необхідності більш вираженого гомеостазу або кращої візуалізації хірургічного поля препаратом вибору є **Ораблок 1:100 000**

Упаковка

- Картриджі 1.8 мл із скла I гідролітичного типу, закриті алюмінієвою кришкою
- Картриджі промарковані відповідно до національних вимог
- Картриджі у прозорих пластикових блістерах, кожен з яких містить 10 картриджів та 5 блістерів в літографованому коробі разом з інструкцією для пацієнта

Спосіб застосування та дози

- Для здорових дорослих — максимальна доза Ораблоку для інфільтраційної та/або провідникової анестезії не повинна перевищувати **7 мг артикаїну на 1 кг маси тіла**
- Дозування слід зменшити у пацієнтів літнього віку та пацієнтам із захворюваннями серця або печінки

Діти

- Лікарський засіб Ораблок вводиться дітям у мінімальній кількості, необхідній для досягнення належного знеболення; кількість введеного препарату підбирається індивідуально, залежно від віку та маси тіла дитини
- Не можна перевищувати максимальну дозу, яка становить **7 мг артикаїну на 1 кг маси тіла**
- **Застосування препарату дітям віком до 1 року не вивчалось**

¹The American Heart Association (AHA) recommends using the lowest possible quantity of epinephrine (Kaplan EL ed. Cardiovascular disease in dental practice. Dallas, TX: American Heart Association, 1986)

- Слід бути обережним, щоб уникнути випадкового внутрішньосудинного введення препарату, це може викликати судом, кому та зупинку дихання
- Місцеві анестезуючі розчини, які містять судинозвужувальний засіб, слід обережно застосовувати, особливо у пацієнтів з порушеннями серцево-судинної функції або судинними захворюваннями
- Введення Ораблоку призводить до збільшення концентрації адреналіну в плазмі у 3–5 разів у порівнянні з вихідним рівнем. Однак у здорових дорослих це не пов'язане з помітним збільшенням артеріального тиску або частоти серцевих скорочень, крім випадкових внутрішньосудинних ін'єкцій
- Найпоширеніша побічна реакція (> 2%) — головний біль
- Повідомте пацієнтів заздалегідь про можливість тимчасової втрати чутливості та функції м'язів після інфільтраційної та провідникової анестезії
- Пацієнтам рекомендується не їсти і не пити до повернення нормального стану

Ораблок є місцевим анестетиком амідного типу, який застосовується у стоматології для інфільтраційної та провідникової анестезії.

Ораблок містить метабісульфіт натрію. Ораблок не можна застосовувати у разі підвищеної чутливості до діючих речовин — епінефрину та артикаїну, а також до сульфатів (метабісульфіту) або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Натрію метабісульфіт рідко може спричинити реакції гіперчутливості та бронхоспазм. Щоб переглянути або завантажити повний текст інструкції відвідайте сайт <http://www.drlz.com.ua/>

ПрАТ «ІНДАР», вул. Зрошувальна, 5, м. Київ, Україна, 02099, тел. +38 044 566 3601
Р.П. №UA/18234/01/01 і № UA/18234/01/02
Наказ МОЗ України №1789 від 04.08.2020

Представлена інформація призначена виключно для розміщення у спеціалізованих виданнях для спеціалістів охорони здоров'я, а також для поширення на конференціях, симпозіумах, семінарах з медичної тематики.